GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FUR DEN ANWENDER

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Lösung zur Anwendung auf der Haut

Eosin-Dinatrium

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Eosine 2% alcohol Kela jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 10 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Eosine 2% alcohol Kela und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela beachten?
3. Wie ist Eosine 2% alcohol Kela anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eosine 2% alcohol Kela aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST EOSINE 2% ALCOHOL KELA UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Eosine 2% alkohol Kela ist ein Desinfektionsmittel zur dermatologischen Verwendung (Gebrauch auf die Haut). Es ist ein Produkt auf Basis von Alkohol und hat eine trocknende Wirkung.

Es ist zu empfehlen als zusätzliche Behandlung bei:

- entzünden dem Hautleiden;
- bestimmten Erkrankungen von Haut und Schleimhaut, anfällig für Rückinfizierung.

Dieses Produkt tötet nicht sämtliche Keime, aber die Anzahl von Keimen wird zeitweilich verringert.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON EOSINE 2 % ALCOHOL KELA BEACHTEN?

Eosine 2% alcohol Kela darf nicht angewendet werden

- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Eosine 2% alcohol Kela oder einen der sonstigen Bestandteile von Eosine 2% alcohol Kela sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela ist erforderlich

- Wenn Sie noch andere Arzneimittel nehmen sollten sie auch die Rubrik „Bei Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela mit anderen Arzneimitteln“ lesen.
- Wenn die Entzündung sich nicht bessern, soll eine mehr Gezielte Behandlung gestartet werden.
- Vermeide längeren Gebrauch auf eine große Oberfläche.

- Eosine 2% Alkohol ist eine Lösung zum auswendigen Gebrauch und darf nicht hinuntergeschluckt werden.

Fragen Sie Ihrem Arzt wenn eine der oben genannte Warnungen für Sie zutreffend sein könnte, oder früher zutreffend war.

Bei Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela mit anderen Arzneimitteln

Vermeide gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden Gebrauch von **verschiedenen Desinfektionsmitteln**.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Seien Sie vorsichtig mit diesem Produkt während der Schwangerschaft.

Dieses Produkt darf verwendet werden während der Stillzeit aber darf nicht angewendet werden um die Brustwarze herum.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Eosine 2% alcohol Kela

Nicht zutreffend.

3. WIE IST EOSINE 2% ALCOHOL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Eosine 2% alcohol Kela immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dies ist ein Produkt zur äußerlichen Verwendung.

Verwende die Lösung unverdünnt. Sie ist 2 bis 3 mal täglich örtlich auf die Haut mit einem sauberen Verbandmull zu applizieren.

Eosine 2% Alkohol Kela darf nicht länger als 10 Tage verwendet werden ohne Befragung des Arztes.

Wenn Sie eine größere Menge von Eosine 2% alcohol Kela angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie dieses Arzneimittel zur äußerlichen Verwendung **versehentlich durch den Mund einnehmen**, könnte der vorhandene Alkohol Magen-Darmbeschwerden und Verwirrtheit verursachen.

Eine Magenspülung und Behandlung der Erscheinungen dürfte notwendig sein

Wenn Sie zu viel Eosine 2% alcohol Kela verwendet oder eingenommen haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder mit der Giftnotrufzentrale auf **(070/245.245)**.

Wenn Sie die Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von Eosine 2% alcohol Kela abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Eosine 2% alcohol Kela Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es besteht ein Risiko von Überempfindlichkeit auf Sonnenlicht, örtlichem Hautausschlag und allergische Reaktionen können auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST EOSINE 2% ALCOHOL KELA AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur (15-25°C) aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Sie dürfen Eosine 2% alcohol Kela nicht verwenden, wenn Sie bemerken dass die Lösung verfärbt ist.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Eosine 2% alcohol Kela enthält

Der Wirkstoff in ist Eosin- Dinatrium.

Die sonstigen Bestandteile sind Ethanol, Ether und Gereinigtes Wasser.

Wie Eosine 2% alcohol Kela aussieht und Inhalt der Packung

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Flasche von 20 ml und 100 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

KELA Pharma nv
Industriepark West 68
B-9100 SINT-NIKLAAS

Hersteller
Purna Pharmaceuticals
Rijksweg 17
B-2870 Puurs

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Zulassungsnummer

BE187503.

Verkaufsabgrenzung

Freie Abgabe.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 02/2012.