Gebrauchsinformation
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** beachten?
3. Wie ist **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. WAS IST Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone sind Lutschtabletten mit antibakterieller Wirkung gegen Erreger von Mundschleimhautentzündungen.
Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone wird zur unterstützenden lokalen Therapie von Mundschleimhautinfektionen (Mundschleimhautentzündungen) angewendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone BEACHTEN?

Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone darf nicht angewendet werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Menthol oder einem der sonstigen Bestandteile von **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone ist erforderlich:

Grundsätzlich ist bei bakteriellen Infektionen die Notwendigkeit einer gezielten antibiotischen Therapie abzuklären.
Bei Verdacht auf eine Virusinfektion bekämpft **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** nicht die Ursache der Erkrankung.

Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion ist die Behandlung mit einem geeigneten Antimykotikum (Medikament für die gezielte Behandlung von Pilzinfektionen) erforderlich.

Kinder und Jugendliche
Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Bei der Anwendung von Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. bis vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Für **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund fehlender Erfahrung sollten Sie **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden und nur nachdem dieser den Nutzen der Behandlung gegenüber den Risiken abgewogen hat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone

Dieses Arzneimittel enthält eine Mischung aus Glucose, Sucrose (Zucker) und Fructose. Bitte nehmen Sie **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 0,1009 g einer Mischung aus Glucose und Fructose (Honig), 1,441 g Sucrose (Zucker) und 0,976 g Glucose entsprechend ca. 0,21 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Wegen des Gehalts an Zucker kann die Entstehung von Karies begünstigt werden. Eine sorgfältige Zahnpflege ist daher notwendig.

3. Wie ist Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone anzuwenden?

Wenden Sie **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:
Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen.

Die Tagesdosis sollte 8 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum.

Hinweis: **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** ist für Erkrankungen vorgesehen, die unter den Anwendungsgebieten genannt sind. Bei schweren Halsentzündungen oder Halsschmerzen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen oder länger als 3 Tage anhalten, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Wie bei allen Lutschtabletten sollte, zur Vermeidung einer Reizung der Mundschleimhaut, die Lutschtablette während des Auflösens im Mund bewegt werden.

Die Anwendung wird bei Kindern unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone angewendet haben, als Sie sollten:
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist eine Überdosierung mit **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** auszuschließen und bisher auch nicht bekannt geworden.

Nach versehentlicher Aufnahme einer Vielzahl von **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone**

benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone vergessen haben:
Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich:
Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, ein Brennen oder Stechen im Mund oder Hals und Schwellungen der Mund- und Rachenschleimhaut können auftreten.

Überempfindlichkeitsreaktionen klingen nach Absetzen des Medikamentes in der Regel rasch wieder ab. Bei Auftreten dieser Erscheinungen, die schon bei Erstanwendung vorkommen können, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Sehr selten:
Magen-Darm-Beschwerden wie Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blisterstreifen angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone enthält:
Die Wirkstoffe sind: 2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol.

Eine Lutschtablette **Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone** enthält 1,2 mg 2,4- Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Weinsäure (Ph.Eur.), Pfefferminzöl (enthält Menthol), Honig (Invertzucker), Zitronenöl, Chinolingelb (E104), Zuckersirup, Glucosesirup.

Wie Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone aussieht und Inhalt der Packung:

Dobendan Strepsils® Synergie Honig & Zitrone sind gelbe, runde, opake Lutschtabletten und in Packungen mit 24 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:
Reckitt Benckiser Deutschland GmbH,
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
Tel.: (0621) 3246-333 www.dobendan.de

Hersteller:
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Nottingham Site, Thane Road
Nottingham, NG90 2DB
Großbritannien

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2009.