pur-bilder.de

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Dolo-Arthrosetten® H, 400 mg, Hartkapsel

Wirkstoff: Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dolo-Arthrosetten® H jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Dolo-Arthrosetten® H und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H beachten?
3. Wie ist Dolo-Arthrosetten® H einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dolo-Arthrosetten® H aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST DOLO-ARTHROSETTEN® H UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dolo-Arthrosetten® H ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates.

Anwendungsgebiete
Zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen (degenerativen Erkrankungen) des Bewegungsapparates.
Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie bei andauernden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DOLO-ARTHROSETTEN® H BEACHTEN?

Dolo-Arthrosetten® H darf nicht eingenommen werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt, dem Wirkstoff von Dolo-Arthrosetten® H oder einen der sonstigen Bestandteile von Dolo-Arthrosetten® H sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H ist erforderlich
Wann dürfen Sie Dolo-Arthrosetten® H nicht einnehmen?
Dolo-Arthrosetten® H darf bei Überempfindlichkeit gegen Teufelskralle oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren nicht eingenommen werden.

Wann dürfen Sie Dolo-Arthrosetten® H erst einnehmen, wenn Sie mit Ihrem Arzt darüber gesprochen haben? Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Dolo-Arthrosetten® H nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen.
Bei Gallensteinleiden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Kinder
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Zur Anwendung von Dolo-Arthrosetten® H in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

Bei Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. WIE IST DOLO-ARTHROSETTEN® H EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Dolo-Arthrosetten® H immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Einzeldosis	Tagesdosis
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren	1 Hartkapsel (entspricht 400 mg Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt)	4 Hartkapseln (entspricht 1600 mg Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt)

Art der Anwendung
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 4-mal täglich 1 Hartkapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).
Hartkapseln nicht im Liegen einnehmen.

pur-bilder.de

Dauer der Anwendung
Die Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt. Bitte beachten Sie jedoch die Angaben unter „1. Was ist Dolo-Arthrosetten® H und wofür wird es angewendet?".

Wenn Sie eine größere Menge Dolo-Arthrosetten® H eingenommen haben, als Sie sollten
Wenn Sie einmal das Doppelte oder das Dreifache der vorgesehenen Einzeldosis (entspricht 2-3 Hartkapseln Dolo-Arthrosetten® H) eingenommen haben, treten die unter „Nebenwirkungen" aufgeführten Symptome möglicherweise verstärkt auf. In diesem Fall und wenn Sie das Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H vergessen haben
Wenn Sie einmal vergessen haben, Dolo-Arthrosetten® H einzunehmen, oder zuwenig eingenommen haben, setzen Sie bitte zum nächsten Zeitpunkt die Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Wenn Sie die Einnahme von Dolo-Arthrosetten® H abbrechen
Bitte brechen Sie die Behandlung mit Dolo-Arthrosetten® H nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ab. Ihre Krankheit könnte sich hierdurch verschlechtern.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Dolo-Arthrosetten® H Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, oder unbekannt

Nebenwirkungen
In seltenen Fällen sind Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen beobachtet worden. Sehr selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschläge, Nesselsucht, Gesichtsödeme bis hin zum Kreislaufzusammenbruch (anaphylaktischer Schock)) beschrieben worden. Sehr selten wurde bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus ein Blutzuckeranstieg beobachtet, der nach Absetzen zurückging.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST DOLO-ARTHROSETTEN® H AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „Verwendbar bis" angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen
Nicht über 25 °C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dolo-Arthrosetten® H enthält:
Eine Hartkapsel enthält:
Wirkstoff: 400 mg Trockenextrakt aus Teufelskrallenwurzeln (2,6-3,1:1; Auszugsmittel: Ethanol 30 % m/m).
Die sonstigen Bestandteile ist sind: Indigocarmin E 132, Titandioxid, Gelatine, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Povidon 30, vorverkleisterte Maisstärke.

Wie Dolo-Arthrosetten® H aussieht und Inhalt der Packung:
Dolo-Arthrosetten® H sind zweifarbige aus Hartgelantine bestehende Steckkapseln (Oberteil hellblau, Unterteil weiß). Der Kapselinhalt ist ein hellbrauner intakter Formling bzw. leicht klumpig.

OP mit 50 Kapseln (N2)
OP mit 100 Kapseln (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
RIEMSER Arzneimittel AG
An der Wiek 7, 17493 Greifswald - Insel Riems
Fon: +49 (0) 38351/ 76-0
Fax: +49 (0) 38351/ 308

Mitvertreiber
Keine Angabe.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet genehmigt im **Jahr 07/ 2007.**

MEDI recycling 1141237/13 Code 109

RIEMSER