GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung.
{Eosin Dinatrium}

Bitte lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Behandlung.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder an etwas zweifeln, bitten Sie Ihren Arzt oder Apotheker um zusätzliche Informationen.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf, damit Sie sie später noch nachlesen können.
- Wenn Sie zusätzliche Ratschläge oder Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Apotheker.
- Wenn sich die Symptome verschlechtern oder nach mehreren Tagen andauern, nehmen Sie bitte Kontakt mit ein Arzt auf.
- Wenn Sie unerwünschte Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Packungsbeilage beschrieben sind, oder wenn Sie eine Nebenwirkung bemerken, die als ernsthaft betrachtet wird, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker darüber.

In dieser Packungsbeilage:

1. WAS IST „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?
2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON„WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ BEACHTEN?
3. WIE IST DAS „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ ANZUWENDEN
4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
5. WIE IST „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ AUFZUBEWAHREN?
6. WEITERE INFORMATIONEN.

1. WAS IST „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dieses Arzneimittel ist eine Lösung zur kutanen Anwendung in 5 ml-Einzeldosisflaschen aus Polyethylen mit in Packungen mit 10 oder 50 Stück.

Es wird als ergänzende Behandlung infizierter und/oder eiternder Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute verwendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ BEACHTEN?

„WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen Eosin sind.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der genannten Warnhinweise bei Ihnen zutrifft oder in der Vergangenheit zutraf.

Vorsichtsmaßnahmen mit „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“

Um mikrobielle Infektionen zu vermeiden, müssen allegeöffneten Flaschen innerhalb von 48 Stunden verbraucht werden.
Nicht längerfristig auf ausgedehnten Hautflächen anwenden.
Augenkontakt vermeiden.
Nicht schlucken.

Das produkt verarsacht fleckon auf der Kleidung.

Bei Anwendung mit anderen Arzneimitteln

Die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Anwendung anderer Lösungen zur kutanen Anwendung (Oxydantien oder Säuren) ist aufgrund des Risikos von Interferenzen zu vermeiden.

Von einem aufeinanderfolgenden Gebrauch anderer Antiseptika wird abgeraten.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, insbesondere andere Augentropfen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft:

Nicht zutreffend.

Stillzeit:

Dank der Abwesenheit von Toxizität kann das wässrige Eosin ohne Beschränkungen auch während der Stillzeit angewendet werden, zumindest in wässriger Lösung. Das wässrige Eosin sollte aber während der Stillzeit nicht auf die Brustwarzen aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Nicht zutreffend.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von „Wässriges Eosin ad 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“

Nicht zutreffend.

3. WIE IST DAS „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ ANZUWENDEN

Wenden Sie das wässrige Eosin immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Die übliche Dosierung ist eine ein- bis zweimal tägliche lokale Anwendung mit Hilfe einer sterilen Kompresse oder durch direktes Gießen auf die zu behandelnde Stelle.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Wenn Sie eine größere Menge von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ angewendet haben als Sie sollten.

Wenn Sie eine große Menge des Produkts angewendet haben, verständigen Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker oder nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit der Giftnotrufzentrale auf (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ vergessen haben

Nicht zutreffend.

Wenn Sie die Anwendung von „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ abbrechen

Nicht zutreffend.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen:

- ✓ Risiko der Lichtempfindlichkeit und lokaler Hautausschläge.

Informieren Sie bitte Ihren Aerzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. WIE IST „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Dieses Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Eine geöffnete Flasche muss innerhalb von 48 Stunden nach dem Öffen verbraucht werden.

Sie dürfen das Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Anzeichen von Nichtverwendbarkeit bemerken.

Das Arzneimittel darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ enthält ?

- Der Wirkstoff ist: Eosin-Dinatrium.
- Der sonstige Bestandteil ist: gereinigtes Wasser

Wie „WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ aussieht und Inhalt der Packung ?

„WÄSSRIGES EOSIN AD 2% GILBERT, sterile Lösung zur kutanen Anwendung“ ist eine wässrige Eosin-Lösung in einer 5 ml-Einzeldosisflasche aus Polyethylen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Laboratoires Gilbert,
928 Avenue du Général de Gaulle,
BP115,
F-14204 HEROUVILLE SAINT – CLAIR Cedex,
FRANKREICH.

Telefon: + 33 (0) 2 31 47 15 15.
Fax: + 33 (0) 2 31 43 95 00.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im : 11/06/2007