GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Furacine Soluble Dressing 2 mg/g Salbe
Furacine 2 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut
Nitrofural

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Furacine jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 5 bis 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Furacine und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Furacine beachten?
3. Wie ist Furacine anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Furacine aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST FURACINE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut und Furacine Soluble Dressing (wasserlösliche Salbe) sind Mittel zur Bekämpfung von Infektionen der Haut auf der Basis von Nitrofural, die für eine externe Anwendung bestimmt sind.

Furacine-Salbe und Furacine-Lösung werden angewandt:
- bei bakteriellen Infektionen von Verletzungen und Verbrennungen
- zur Vermeidung bakterieller Infektionen von Verletzungen und Verbrennungen
- bei Hauttransplantationen

Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut, verdünnt mit sterilem Wasser, wird ebenfalls als Blasenspülung angewandt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FURACINE BEACHTEN?

Furacine darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Nitrofural oder einen der sonstigen Bestandteile von Furacine sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Furacine ist erforderlich
Nicht zutreffend.

Bei Anwendung von Furacine mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bei Anwendung von Furacine zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Nicht zutreffend.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Furacine darf in der Schwangerschaft und Stillzeit ausschließlich auf ärztliche Vorschrift verwendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Furacine übt keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, aus.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Furacine
Nicht zutreffend.

3. WIE IST FURACINE ANZUWENDEN?

Wenden Sie Furacine immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Äusserliche Anwendung
Anwendung auf der Haut.

Verletzungen und Verbrennungen
Sie können die Salbe oder die Lösung anwenden. Beide wirken gleich.

Anwendungsweise:
- Infizierte Wunden:
  Nach dem Säubern der Wunde die *Furacine Soluble Dressing* direkt auf der Wunde anbringen. Furacine Soluble Dressing kann auch erst auf einem Verband, der auf die Wunde gelegt wird, angebracht werden.

  Vor dem Auftragen der *Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut* erst ein Stück Verband benutzen. Bei der Benutzung von Druckverbänden müssen letztere in eine saubere Schale mit ein wenig Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut übergießen. Die übrig bleibende Lösung (den Überschuss) nicht wieder in die Flasche schütten.
  Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut kann bei niedriger Temperatur trüb werden. Setzen Sie in solchem Fall die Flasche in ein Warmwasserbad von zirka 60°C, bis die Lösung wieder hell wird. Bewahren Sie die Flasche danach an einer kühleren Ort auf.

- Verbrennungen:
  Der erste Schritt bei Verbrennungen: 15 Minuten lang mit kaltem Wasser spülen, um das Einbrennen einzuschränken. Dann Furacine Soluble Dressing oder Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut in der gleichen Weise wie für infizierte Wunden anwenden. Ernsthafte Verbrennungen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Häufigkeit und Dauer der Behandlung:
- Auf infizierte Wunden wird meist zweimal täglich Furacine aufgetragen. Wenn nach 5 bis 7 Behandlungstagen noch keine eindeutige Besserung aufgetreten ist, müssen Sie sich an den Arzt wenden.
- Bei Verbrennungen nicht öfter als einmal täglich auftragen. Der Arzt entscheidet, wie häufig der Verband gewechselt werden muss.

Blasenspülung
Nur verdünnte Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut anwenden. Folgen Sie strikt den Anweisungen Ihres Arztes.

Wenn Sie eine größere Menge von Furacine angewendet haben, als Sie sollten
Wenn Sie eine größere Menge von Furacine Soluble Dressing oder Furacine Oplossing angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245). Furacine ist für externen Gebrauch bestimmt. Wurde Furacine oral eingenommen, können Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen die Folge sein. Sofort einen Arzt aufsuchen. Der Arzt kann den Patienten zum Erbrechen bringen oder eine Magenspülung vornehmen.

Wenn Sie die Anwendung von Furacine vergessen haben
Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Furacine abbrechen
Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie denken die Anwendung abzubrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH

Wie alle Arzneimittel kann Furacine Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Ungefähr 1 Person von 100 verträgt Furacine nicht gut. Die Haut wird dann rot, sticht und juckt an der Stelle, an der das Produkt angebracht wurde. In einem solchen Fall ist unverzüglich mit der Anwendung von Furacine aufzuhören und Verbindung zum Arzt aufzunehmen.

Das Gebrauch von Nitrofural kann Überwucherung von Bakterien oder Pilzen verursachen, was zu einer sekundären Infektion führen kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST FURACINE AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Furacine Soluble Dressing und Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: bei Zimmertemperatur (15-25°C) aufbewahren. Wird Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut zu kalt aufbewahrt, kann die Lösung trüb werden. In diesem Fall die Flasche in ein Warmwasserbad von ungefähr 60°C stellen, bis die Lösung wieder heller geworden ist.

Sie dürfen Furacine Soluble Dressing nach der auf der Packung, dem Etikett und im Falz der Tube nach EXP angegebenen Verfalldatum, und Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut nach der auf der Packung und dem Etikett nach EXP angegebenen Verfalldatum, nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Furacine enthält
- Der Wirkstoff ist : Nitrofural 2 mg/g oder 2 mg/ml.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
    - Furacine Soluble Dressing: Macrogol 300, 1000, 3000.
    - Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: Macrogol 300, 1500 und gereinigtes Wasser.

Wie Furacine aussieht und Inhalt der Packung
Furacine Soluble Dressing ist eine gelbe Salbe in Tuben von 15 g, 28 g und 30 g oder aluminium Beuteln von 375 g (Krankenhaus).
Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut ist eine klare gelbe Flüssigkeit in braunen Glasflaschen von 200 ml, 250 ml und 500 ml (Krankenhaus) oder zwei Glasflaschen von 250 ml (Krankenhaus).

Zulassungsnummer:
Furacine Soluble Dressing - Tube: BE089966
Furacine Soluble Dressing - Beutel: BE300876
Furacine Lösung zur Anwendung auf der Haut: BE001547

Art der Abgabe: freie Abgabe.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Pharmazeutischer Unternehmer
Limacom nv
Ginderoverstraat 32
3590 Diepenbeek

Hersteller
Sanico N.V./S.A.
Industrieterrein 4
2300 Turnhout

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 06/2011.