GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

MOVICOL® Neutral 13,7 g Beutel, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss MOVICOL Neutral jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist MOVICOL Neutral und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von MOVICOL Neutral beachten?
3. Wie ist MOVICOL Neutral einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MOVICOL Neutral aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MOVICOL NEUTRAL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Der Name dieses Arzneimittels ist MOVICOL Neutral 13,7 g Beutel, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Es ist ein Laxativum zur Behandlung von Verstopfung bei Erwachsenen, Jugendlichen und älteren Personen. Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

MOVICOL Neutral verhilft Ihnen zu einer komfortablen Darmtätigkeit, selbst wenn Sie bereits über einen langen Zeitraum unter Verstopfung gelitten haben. MOVICOL Neutral ist auch wirksam bei einer hartnäckigen Verstopfung mit Kotstauung im Darm, Koprostase genannt.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MOVICOL NEUTRAL BEACHTEN?

Nehmen Sie MOVICOL Neutral nicht ein, wenn Ihnen Ihr Arzt mitgeteilt hat, dass Sie eine der folgenden Beschwerden haben:
- eine Darmverstopfung (Darmverschluss, Ileus)
- eine Darmdurchbruch (Perforation)

- schwere entzündliche Darmerkrankungen, wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder toxisches Megacolon
- Überempfundlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von MOVICOL Neutral.

Herzkrankheiten
Befolgen Sie die besonderen Hinweise in Abschnitt 3, wenn Sie MOVICOL Neutral zur Behandlung von Koprostase einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit
MOVICOL Neutral kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Ihre Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wird von MOVICOL Neutral nicht beeinträchtigt.

Bei Einnahme von MOVICOL Neutral mit anderen Arzneimitteln
Die Wirksamkeit einiger Arzneimittel, wie beispielsweise Antiepileptika, kann während der Einnahme von MOVICOL Neutral verringert werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. WIE IST MOVICOL NEUTRAL EINZUNEHMEN?

Sie können dieses Arzneimittel zu jeder beliebigen Zeit und unabhängig von der Aufnahme von Nahrungsmitteln und Getränken einnehmen.

Verstopfung:
Eine Dosis von MOVICOL Neutral entspricht 1 Beutel.
Entsprechend der Schwere Ihrer Verstopfung nehmen Sie 1 – 3 mal täglich 1 Beutel.

Koprostase:
Bevor Sie MOVICOL Neutral zur Behandlung der Koprostase anwenden, sollte die Diagnose der hartnäckigen Verstopfung mit Kotstauung im Darm, Koprostase genannt, gesichert sein.
Zur Behandlung der Koprostase benötigen Sie eine Dosis von 8 Beutel MOVICOL Neutral täglich. Die Dosis von 8 Beuteln ist innerhalb von 6 Stunden und – je nach Erfordernis – über einen Zeitraum von bis zu 3 Tagen einzunehmen. Patienten mit Herzerkrankungen dürfen nicht mehr als 2 Beutel pro Stunde einnehmen.

Herstellen der Lösung:
Öffnen Sie den Beutel und geben Sie den Inhalt in ein Glas. Fügen Sie ca. 125 ml Wasser hinzu. Rühren Sie so lange, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und die MOVICOL Neutral -Lösung klar oder leicht trüb ist. Nun können Sie die Lösung trinken. Wenn Sie MOVICOL Neutral gegen Koprostase einnehmen, kann es einfacher sein, alle 8 Beutel in 1 Liter Wasser aufzulösen.

Dauer der Anwendung:
Verstopfung:
Die Behandlung mit MOVICOL Neutral dauert üblicherweise ca. 2 Wochen. Wenn Sie MOVICOL Neutral über einen längeren Zeitraum einnehmen müssen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Wenn Ihre Verstopfung von einer Krankheit wie z. B. Parkinson oder Multiple Sklerose (MS) verursacht wird oder wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Verstopfung verursachen, kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen, MOVICOL Neutral länger als 2 Wochen einzunehmen.
Für die Langzeitbehandlung kann diese Dosis gewöhnlich auf 1 oder 2 Beutel pro Tag reduziert werden.
Koprostase:
Die Behandlung mit MOVICOL Neutral kann bis zu 3 Tage dauern.

Wenn Sie eine größere Menge von MOVICOL Neutral eingenommen haben, als Sie sollten
Es kann sein, dass Sie Durchfall bekommen, welcher zu einer Austrocknung des Körpers führen kann. Falls dies eintritt, sollte Sie die Einnahme von MOVICOL Neutral stoppen und reichlich Flussigkeiten zu sich nehmen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie mehr MOVICOL Neutral angewendet haben, als Sie sollten, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von MOVICOL Neutral vergessen haben
Nehmen Sie die Dosis ein, sobald Sie sich daran erinnern.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann MOVICOL Neutral Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nehmen Sie MOVICOL Neutral nicht mehr ein und informieren Sie umgehend Ihren Arzt, wenn:
- Sie eine schwerwiegende allergische Reaktion bekommen, die Schwierigkeiten beim Atmen, Schwindel oder ein Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals- und Rachenbereich auslöst.

Weitere Nebenwirkungen beinhalten:
Allergische Reaktionen, die Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut oder Nesselsucht, geschwollene Hände, Füße oder Knöchel auslösen können, Kopfschmerzen und erhöhte und erniedrigte Kaliumkonzentrationen im Blut.

Manchmal können bei Ihnen Bauchschmerzen oder Darmgeräusche auftreten. Sie können sich auch aufgebläht fühlen, an Blähungen, Übelkeit oder Erbrechen leiden, Reizungen des Darmausgangs und bei Beginn der Einnahme von MOVICOL Neutral einen leichten Durchfall verspüren. Diese Nebenwirkungen verbessern sich im Allgemeinen, sobald die Dosis von MOVICOL Neutral reduziert wird.

Wenn eine der oben genannten Nebenwirkungen störend wirkt oder länger als ein paar Tage andauert oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. WIE IST MOVICOL NEUTRAL AUFZUBEWAHREN?

Alle Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Beutel und dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Beutel nicht über 25 °C lagern.

Sobald Sie MOVICOL Neutral in Wasser aufgelöst haben und es nicht umgehend vollständig trinken können, halten Sie es verschlossen und lagern Sie es im Kühlschrank (2 - 8° C). Entsorgen Sie die Lösung, die Sie nicht innerhalb von 6 Stunden aufgebraucht haben.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Jeder 13,7 g Beutel MOVICOL Neutral enthält folgende Bestandteile:

Macrogol 3350	13,125 g
Natriumchlorid	0,3508 g
Natriumhydrogencarbonat	0,1786 g
Kaliumchlorid	0,0502 g

Für jeden Beutel ergeben sich nach Auflösen in 125 ml Wasser folgende Werte:

Natrium	65 Millimol/Liter
Chlorid	53 Millimol/Liter
Kalium	5,4 Millimol/Liter
Hydrogencarbonat	17 Millimol/Liter

Wie MOVICOL Neutral aussieht und Inhalt der Packung
MOVICOL Neutral ist ein Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. MOVICOL Neutral ist erhältlich in Packungen mit 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder 100 Beuteln. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer:
Norgine NV/SA, Haasrode Research Park, Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, Belgien

Hersteller:
Norgine Ltd, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, U.K.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien	MOVICOL Neutral
Finnland	MOVICOL Plain
Irland	MOVICOL Plain
Italien	MOVICOL Dearoma
Niederlande	MOVICOLon Naturel
Österreich	MOVICOL Aromafrei
Spanien	MOVICOL Sabor Neutro
Schweden	MOVICOL Neutral
Schweiz	MOVICOL Aromafrei
Vereinigtes Königreich	MOVICOL Plain

Zulassungsnummer:
BE328465

Verschreibungsart:
Apothekenpflichtig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 06/2013
Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 05/2013.