Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gencydo® 0,1 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Gencydo® 0,1 % beachten?
3. Wie ist Gencydo® 0,1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Gencydo® 0,1 %

Augentropfen

WELEDA

Wirkstoffe: Citrus limon, Succus und wässriger Auszug aus Cydonia oblonga, Fructus rec.

1. Was ist Gencydo® 0,1 % und wofür wird es angewendet?
Gencydo® 0,1 % ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei allergischen Erkrankungen.

Anwendungsgebiete
Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Behandlung allergischer Augenreizungen, z.B. bei Heuschnupfen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Gencydo® 0,1 % beachten?

Gencydo® 0,1 % darf nicht angewendet werden,
wenn Sie überempfindlich gegen Zitrusfrüchte sind oder wenn Sie unter trockenen Augen (verminderte Tränensekretion) leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder bei plötzlichem Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist es ebenfalls ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

Kinder
Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 5 Jahren sollen Gencydo® 0,1% Augentropfen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte Gencydo® 0,1 % in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt

3. Wie ist Gencydo® 0,1 % anzuwenden?
Wenden Sie Gencydo® 0,1 % immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
1 – 3 mal täglich 1 Tropfen in den Bindehautsack träufeln.

Dauer der Anwendung
Gencydo® 0,1% Augentropfen sollen bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden. Die Behandlung kann sich, je nach dem auf welche Pollen die allergische Reaktion erfolgt bzw. je nach Wetterlage, über mehrere Tage bis Wochen erstrecken.
Die Dauer der Behandlung von chronischen Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Gencydo® 0,1 % vergessen haben:
Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Gencydo® 0,1% Augentropfen können, insbesondere bei trockenen Augen, nach dem Einträufeln im Auge zunächst ein leichtes Brennen verursachen, das jedoch rasch abklingt.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Verwenden Sie die Augentropfen nach dem ersten Öffnen nicht länger als 4 Wochen. Bitte tragen Sie das Datum in das dafür vorgesehene Feld auf dem Etikett und der Faltschachtel ein.

Zusammensetzung
10 g (= 10 ml) enthalten: Wirkstoffe: 8 - 12 mg Citrus limon, Succus, entsprechend 0,65 mg Fruchtsäuren, berechnet als Citronensäure / 30 mg wässriger Auszug aus Cydonia oblonga, Fructus rec. (1:2,1).
Sonstige Bestandteile: Kaliumnitrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke.
Oligodynamische Silberkonservierung.

Darreichungsform und Packungsgröße
10 ml Augentropfen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200
E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: April 2014

Bitte beachten:
1. Vor dem ersten Gebrauch Originalverschluss an der vorgesehenen Lasche aufreißen. Die Augentropfenflasche in geschlossenem Zustand einmal kurz mit dem Kopf nach unten schütteln.
2. Schutzkappe entfernen.
3. Durch Druck auf das Gummiteil Tropfen ins Auge träufeln.
4. Schutzkappe sofort wieder fest aufdrücken.