GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER
Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees
Wirkstoff: Trockenextrakt aus frischen Artischockenblättern (Folium Cynarae)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage enthält:

1. Was sind Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees beachten?
3. Wie sind Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG DRAGEES UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Die Inhaltsstoffe der Artischocke weisen vielfältige positive Wirkungen bei Verdauungsbeschwerden, insbesondere bei Störungen der Galle-Funktion sowie beim Fettstoffwechsel auf.

Der verwendete Extrakt aus frischen Artischockenblättern fördert nicht nur die Bildung von Gallenflüssigkeit in der Leber sondern auch den Gallenfluss selbst. Dadurch wird fetthaltige Nahrung besser vertragen – Beschwerden wie Völlegefühl, Krämpfe im Oberbauch und das Entstehen von Blähungen werden vermindert. Die erhöhte Produktion von Gallensäure verbessert außerdem die Verdauung und hat einen positiven Einfluss auf die Darmaktivität.

Dieses Arzneimittel eignet sich auch zur Regulierung und Senkung erhöhter Cholesterin- und Blutfettwerte: Überschüssiges Cholesterin kann vermehrt

über die Galle aus dem Körper ausgeschieden werden, gleichzeitig wird die Neubildung von Cholesterin vermindert.

DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG DRAGEES werden verwendet:

Als pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden wie Druck- und Völlegefühl, Übelkeit, Blähungen, Aufstoßen sowie krampfartigen Beschwerden im Magen- und Darmbereich.
Bei Störungen der Galle-Funktion.
Zur Unterstützung der Fettverdauung, speziell nach üppigen und schweren Mahlzeiten. Zur Regulierung und Verbesserung des Fettstoffwechsels.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG DRAGEES BEACHTEN?

Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees dürfen nicht angewendet werden

bei bekannter Allergie gegen Artischocken und andere Korbblütler, Verschluss der Gallenwege sowie Gallensteinleiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees ist erforderlich

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollten Sie, wie bei allen unklaren Beschwerden, einen Arzt aufsuchen.

Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees werden für die Anwendung bei Kindern nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Bei Einnahme von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Aus der verbreiteten Anwendung von Artischocke als Arzneimittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und in der Stillzeit ergeben, Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen aber nicht vor. Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees sollten deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees haben keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluß auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees
Dieses Arzneimittel enthält u.a. Glucose und Saccharose.
Bitte nehmen Sie Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. WIE SIND DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG DRAGEES EINZUNEHMEN?

Verdauungsbeschwerden:
Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3 mal täglich 1 Dragee vor den Mahlzeiten ein.

Zur Regulierung und Verbesserung des Fettstoffwechsels:
Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene morgens und abends je 2 Dragees vor den Mahlzeiten ein.

Die Dragees sollten mit ausreichend Flüssigkeit und unzerkaut eingenommen werden.

Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees werden für die Anwendung bei Kindern nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees eingenommen haben, als Sie sollten
Wenn Sie versehentlich einmal das Doppelte oder Dreifache der vorgesehenen Dosierung eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
Wie alle Arzneimittel können Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Sehr selten kann eine leicht abführende Wirkung auftreten, die genaue Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt.

5. WIE SIND DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG DRAGEES AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees dürfen nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.
Vor Feuchtigkeit schützen, nicht über 25°C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees enthalten
1 Dragee enthält: 450mg Trockenextrakt aus frischen Artischockenblättern (Folium Cynarae) (Verhältnis Auszugspflanze:Extrakt 25 - 35 : 1)
Auszugsmittel: Wasser

Die sonstigen Bestandteile sind:
Drageekern: Talkum, Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid, Calciumcarbonat, Glucosesirup, Kartoffelstärke,
Drageehülle: Eudragit E, Saccharose, Eisen(III)oxid rot E 172, Arabisches Gummi, Carmellose-Natrium,
Carnaubawachs, Talkum, Calciumcarbonat, hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie sehen DR. BÖHM ARTISCHOCKE 450 MG Dragees aus und was ist der Inhalt der Packung

Dr. Böhm Artischocke 450 mg Dragees sind braunrote, runde überzogene Tabletten in PVC/PVDC/Aluminium-Blisterstreifen. Sie sind in Packungsgrößen zu 30 Stück erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3
8011 Graz
Tel 0316 82 35 33
Fax 0316 82 35 33 52
office@apomedica.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im
Juli 2007