Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Spenglersan Kolloid Om – Lösung zur äußerlichen Anwendung
Antigene aus Lactococcus lactis subsp. Lactis, Antigene aus Streptococcus pyogenes, Antigene aus Streptococcus oralis, Antigene aus Streptococcus pneumoniae, Antigene aus Staphylococcus saprophyticus subsp. Saprophyticus, Antigene aus Staphylococcus aureus subsp. Aureus, Antigene aus Neisseria sicca, Antigene aus Mycobacterium bovis

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Spenglersan Kolloid Om jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Spenglersan Kolloid Om und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid Om beachten?
3. Wie ist Spenglersan Kolloid Om anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spenglersan Kolloid Om aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Spenglersan Kolloid Om und wofür wird es angewendet?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören:
Leichte Formen von Infektanfälligkeit, Erschöpfungszuständen, Lymphadenopathie, Kreislaufregulationsstörungen, venösen Erkrankungen, allergischer Diathese.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Spenglersan Kolloid Om beachten?

Wann darf Spenglersan Kolloid Om nicht angewendet werden?
Spenglersan Kolloid Om Lösung zur äußerlichen Anwendung darf nicht bei Überempfindlichkeit gegen Antigene aus Lactococcus lactis subsp. lactis Dil. D9, Antigene

aus Streptococcus pyogenes Dil. D9, Antigene aus Streptococcus oralis Dil. D9, Antigene aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9, Antigene aus Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus Dil. D9, Antigene aus Staphylococcus aureus subsp. aureus Dil. D9, Antigene aus Neisseria sicca Dil. D9, Antigene aus Mycobacterium bovis Dil. D9 oder einen der sonstigen Bestandteile angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spenglersan Kolloid Om ist erforderlich

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist die Anwendung des Arzneimittels abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können. Beim Auftreten neuer Beschwerden ist die Anwendung des Arzneimittels ebenfalls abzubrechen.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl, ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Anwendung von Spenglersan Kolloid Om mit anderen Arzneimitteln
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis (ACHTUNG STEHT NICHT BEI Sp.KOLLOID T!)*:*
In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel (Nikotin, Alkohol, Kaffee) ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Spenglersan Kolloid Om hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist Spenglersan Kolloid Om anzuwenden?

Wenden Sie Spenglersan Kolloid Om immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Dosierung:

Erwachsene:
3 x täglich 5-10 Sprühstöße;
Mit 1 x täglich 5 Sprühstößen beginnen, maixmal jedoch 30 Sprühstöße täglich.
Individuelle Reaktionen müssen beachtet werden, um die Dosis anzupassen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen werden.

Art der Anwendung:
Auf die Innenseite des Ellenbogens aufsprühen und einreiben.

Halten Sie beim Sprühen die Flasche senkrecht und betätigen Sie vor dem erstmaligen Benutzen mehrfach den Sprühmechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels.

Bei Anwendung mehrerer Spenglersan Kolloide sollen diese in einem Abstand von mindestens 2 Stunden oder im täglichen Wechsel angewendet werden.

Dauer der Anwendung:
Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder länger als 7 Tage andauern, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Spenglersan Kolloid Om angewendet haben als Sie sollten
Es ist nicht mit unerwünschten Auswirkungen zu rechnen.

Wenn Sie die Anwendung von Spenglersan Kolloid Om vergessen haben
Wiederholen Sie diese Anwendung nicht, sondern fahren Sie mit der nächsten Einreibung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.
Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. Wie ist Spenglersan Kolloid Om aufzubewahren?
Nicht über 25°C lagern. Vor starker Sonnenbestrahlung und starken elektromagnetischen Feldern (z.B.: Mikrowelle, Bildschirme) geschützt aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. Weitere Informationen

Was Spenglersan Kolloid Om enthalten:
100 g Spenglersan Kolloid Om enthalten:
Wirkstoffe:

Antigene aus Lactococcus lactis subsp. lactis Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Streptococcus pyogenes Dil. D9	22,2 g
Antigene aus Streptococcus oralis Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Streptococcus pneumoniae Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Staphylococcus aureus subsp. aureus Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Neisseria sicca Dil. D9	11,1 g
Antigene aus Mycobacterium bovis Dil. D9	11,1 g

Die sonstigen Bestandteile sind:
Thymol, Zuckersirup Salzsäure 25% ethanolhältige Jodlösung und gereinigtes Wasser.

1 Sprühstoß entspricht 1 Tropfen

Wie Spenglersan Kolloid Om aussieht und Inhalt der Packung
Braunglasflasche mit Pumpe und Sprühkopf.
Packungsgrößen: 10 (20, ~~50, 100~~) ml (bei uns ist nur 10ml und 20 ml gemeldet)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Meckel-Spenglersan GmbH, Steinfeldweg 13, D-77815 Bühl, Deutschland
Tel.: 0049722330671, Fax: 00497223/8713

Zulassungsnummer: 3-00163

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September 2011.