Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Venostasin®-*Gel Aescin*** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist **Venostasin®-*Gel Aescin*** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor dem Auftragen von **Venostasin®-*Gel Aescin*** beachten?
3. Wie ist **Venostasin®-*Gel Aescin*** aufzutragen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Venostasin®-*Gel Aescin*** aufzubewahren?

Venostasin®-*Gel*

Aescin

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Aescin.

100 g Gel enthalten 1,00 g Aescin.

Die sonstigen Bestandteile sind:
2-Propanol (Ph. Eur.), Propylenglycol, Carbomer 980, Trolamin.

Venostasin®-*Gel Aescin* ist in Packungen mit 40 g und 100 g Gel erhältlich.

1. WAS IST VENOSTASIN®-*GEL AESCIN* UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Venostasin®-*Gel Aescin* ist ein traditionelles Arzneimittel
von:

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller	Mitvertrieb
Astellas Pharma GmbH Postfach 80 06 28 81606 München Telefon (0 89) 45 44-01 Telefax (0 89) 45 44-13 29	KLINGE PHARMA GmbH Postfach 80 15 07 81615 München Telefon (0 89) 45 44-02 Telefax (0 89) 45 44-13 17 Internet: www.klinge.de

Venostasin®-*Gel Aescin* wird traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Bei Auftreten von Krankheitszeichen, besonders bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung, v. a. wenn sie nur an einem Bein auftreten, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON VENOSTASIN®-*GEL AESCIN* BEACHTEN?

Venostasin®-*Gel Aescin* darf nicht angewendet werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aescin oder einen der sonstigen Bestandteile sind
- auf geschädigter Haut, wie z. B. bei Verbrennungen, Ekzemen oder bei offenen Wunden

Schwangerschaft und Stillzeit
Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte **Venostasin®-*Gel Aescin*** in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Kinder
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. **Venostasin®-*Gel Aescin*** sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Der Kontakt von **Venostasin®-*Gel Aescin*** mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach Auftragen von **Venostasin®-*Gel Aescin*** sollen die Hände gründlich gereinigt werden.

Hinweis
Die Anwendung von **Venostasin®-*Gel Aescin*** ersetzt nicht sonstige vorbeugende oder Behandlungsmaßnahmen wie z. B. kalte Wassergüsse oder das Tragen ärztlich verordneter Stützstrümpfe.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Für **Venostasin®-*Gel Aescin*** sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

3. WIE IST VENOSTASIN®-*GEL AESCIN* ANZUWENDEN?
Soweit nicht anders verordnet, tragen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre **Venostasin®-*Gel Aescin*** zwei- bis dreimal täglich dünn und gleichmäßig auf die intakte Haut über den betroffenen Körperpartien auf.

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Punkt 2.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
Wie alle Arzneimittel kann **Venostasin®-*Gel Aescin*** Nebenwirkungen haben.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Überempfindlichkeitsreaktionen:
Selten:
- Allergische Hautreaktionen

Gegenmaßnahmen
Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautrötung und Juckreiz) sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

5. WIE IST VENOSTASIN®-*GEL AESCIN* AUFZUBEWAHREN?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
Nicht über 25° C aufbewahren.
Behältnis nach Gebrauch fest verschließen.
Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

astellas

Stand der Information
September 2005