PHOENIX Pharmahandel
bereitgestellt für die PNI Dokumente
10.10.2011

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

CYSTO FINK MONO

Wirkstoff:
1 Hartkapsel enthält:
Echtes Goldrutenkraut-Trockenextrakt (5,0-7,1 : 1) 424,8 mg
Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss CYSTO FINK MONO jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
• Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
• Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
• Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist CYSTO FINK MONO und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CYSTO FINK MONO beachten?
3. Wie ist CYSTO FINK MONO einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CYSTO FINK MONO aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST CYSTO FINK MONO UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

CYSTO FINK MONO ist ein Pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der Harnwege.

Anwendungsgebiete:
Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß; zur vorbeugenden Behandlung bei Harnsteinen und Nierengrieß.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CYSTO FINK MONO BEACHTEN?

CYSTO FINK MONO darf nicht eingenommen werden:
- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Goldrutenkraut oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- Eine Durchspülungsbehandlung darf bei Wassereinlagerungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit nicht durchgeführt werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von CYSTO FINK MONO ist erforderlich:
- Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von CYSTO FINK MONO mit anderen Arzneimitteln:
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von CYSTO FINK MONO zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:
Zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. CYSTO FINK MONO soll deshalb in Schwangerschaft und

Stillzeit nicht angewendet werden.
Kinder:
Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. CYSTO FINK MONO soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

3. WIE IST CYSTO FINK MONO EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie CYSTO FINK MONO immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 3-4 x täglich 1 Hartkapsel ein.
Art der Anwendung:
Nehmen Sie die Hartkapsel unzerkaut nach den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit (z. B. ½ Glas Wasser) ein.
Beachten Sie bitte, dass nicht nur bei der Einnahme sondern während des ganzen Tages reichlich Flüssigkeit zugeführt wird, da CYSTO FINK MONO sonst nicht richtig wirken kann.
Dauer der Anwendung:
Die Dauer der Anwendung ist nicht grundsätzlich begrenzt, richtet sich aber nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung. Im Zweifelsfall befragen Sie einen Arzt.
Beachten Sie bitte in jedem Fall die Hinweise unter Punkt 2 und 4.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von CYSTO FINK MONO zu stark oder zu schwach ist.
Wenn Sie eine größere Menge CYSTO FINK MONO eingenommen haben, als Sie sollten:
Vergiftungsfälle liegen nicht vor. Es ist jedoch zu erwarten, dass die unter Nebenwirkungen geschilderten Symptome verstärkt auftreten.
Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.
Wenn Sie die Einnahme von CYSTO FINK MONO vergessen haben:
Holen Sie bitte die vergessene Einnahme nicht nach, sondern setzen Sie beim nächsten Mal die Einnahme von CYSTO FINK MONO, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben (bzw. wie verordnet), fort.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann CYSTO FINK MONO Nebenwirkungen haben.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:
Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten: weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten: weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle
Gelegentlich können Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Sodbrennen, Völlegefühl, Durchfall und Blähungen auftreten; selten sind Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. als Juckreiz, Hautausschlag und Nesselsucht) möglich.
Bei auftretenden Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.
Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf CYSTO FINK MONO nicht nochmals eingenommen werden.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST CYSTO FINK MONO AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. Durchdrückpackung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen :
Nicht über 30 ºC lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was CYSTO FINK MONO enthält:

Wirkstoff:
1 Hartkapsel enthält:
Trockenextrakt aus echtem Goldrutenkraut (5,0-7,1 : 1) 424,8 mg
Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m)

Die sonstigen Bestandteile sind:
Cellulosepulver; Gelatine; Magnesiumstearat; Natriumdodecylsulfat; gefälltes Siliciumdioxid; hochdisperses Siliciumdioxid, methyliert; Stärke, modifiziert; gereinigtes Wasser; Eisen(III)-oxid (E172).

Erhältliche Packungsgrößen:
Originalpackung mit 40, 60, 120 oder 200 Hartkapseln.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,
D-77815 Bühl

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2006

PHOENIX Pharmahandel
bereitgestellt von der PIN Dokumentation
10.10.2011