Gebrauchsanweisung
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung von Eubiolac Verla® beachten sollen.

Eubiolac Verla®

Vaginaltabletten

Zusammensetzung

1 Vaginaltablette enthält 61 mg Calciumlactat-Pentahydrat (entsprechend 50 mg Milchsäure).

Sonstige Bestandteile: Weinsäure (Ph. Eur.), Kaliumhydrogentartrat (Ph. Eur.), Natriumhydrogencarbonat, Lactose-Monohydrat, Talkum, Weizenstärke, Albumin aus Hühnereiweiß, Macrogol 35 000, Povidon (K 25).

Anwendungsgebiete

Eubiolac Verla® wird zur Vorbeugung und Behandlung von Störungen der Vaginalflora eingesetzt, z. B. bei chronischer oder immer wiederkehrender bakterieller Vaginose, bei unspezifischer Kolpitis leichter bis mittelschwerer Ausprägung sowie bei Dysbiose.

Gegenanzeigen


Eubiolac Verla® darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Inhaltsstoffe sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Eubiolac Verla® kann ohne Bedenken in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Dosierung und Art der Anwendung

1-mal täglich 1 Vaginaltablette kurz vor dem Zubettgehen am Abend tief in die Scheide einführen. Die Anwendung sollte über einen Zeitraum von mindestens 6-12 Tagen erfolgen.



Um eine nachhaltige Normalisierung des vaginalen Milieus zu erreichen und um Rückfälle zu vermeiden, wird eine Wiederholung der Kur in abgekürzter Form im Anschluss an die auf die 1. Behandlung folgende Regelblutung empfohlen. Eine längerfristige Anwendung über mehrere Wochen empfiehlt sich besonders dann, wenn aufgrund bestimmter Begleitumstände (z. B. Einnahme von Antibiotika, hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren) eine Änderung des normalen Scheidenmilieus zu erwarten ist. Eubiolac Verla® kann bedenkenlos auch über mehrere Monate angewendet werden.

Nebenwirkungen

Gelegentlich kann es zu Brennen und Juckreiz in der Scheide kommen, insbesondere wenn die Scheidenschleimhaut durch Reiben oder Kratzen bereits vorgeschädigt ist. Diese Nebenwirkungen lassen sich häufig vermeiden, indem die Vaginaltablette – wie in der Dosierungsanleitung beschrieben – möglichst tief in die Scheide eingeführt wird.

Hinweis: Juckreiz ist oft auch auf eine Pilzinfektion zurückzuführen, die als Folge eines gestörten vaginalen Milieus auftreten kann. In diesem Fall sollte eine geeignete Behandlung der Pilzinfektion erfolgen.

Haltbarkeit

Das Verfalldatum dieses Medizinprodukts ist außen auf der Faltschachtel und auf der Durchdrückpackung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum!

Hersteller

Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co.KG,
82324 Tutzing, www.verla.de

Stand der Information

April 2015

CE 0197

7300506
0415

Kullanım talimatı
Lütfen bu kullanım talimatını dikkatle okuyunuz çünkü Eubiolac Verla®'yı kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli bilgiler içermektedir.

Eubiolac Verla®

Vajinal Tablet

Bileşimi

1 Vajinal tablet 61 mg kalsiyum laktat pentahidrat (50 mg laktik aside denktir) içerir.

Diğer bileşenleri: tartarik asit (Ph.Eur.), potasyum hidrojentartarat (Ph.Eur.), sodyum hidrojenkarbonat, laktoz monohidrat, talkum, buğday nişastası, tavuk yumurtası akı albümini, Macrogol 35 000, Povidon (K 25).

Kullanım alanları

Eubiolac Verla® vajinal flora bozukluklarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır, örneğin kronik veya sürekli tekrarlayan bakteriyel vajinoz, hafif ila orta şiddetli unspesifik kolpit ve disbiozis.

Karşı endikasyonlar


İçerdiği maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) olmanız durumunda Eubiolac Verla® kullanılamaz.

Gebelik ve emzirme dönemleri

Eubiolac Verla®'nın gebelik veya emzirme dönemlerinde uygulanmasında mahzur yoktur.

Dozajı ve uygulanma şekli

Günde 1 kez 1 vajinal tablet gece yatmadan kısa bir süre önce vajene derinlemesine yerleştirilir. Uygulama en az 6 ila12 gün süreyle devam etmelidir.



Vajinal ortamın normale dönüşünün sürdürülebilir olmasını sağlamak ve nüksleri önlemek için 1. uygulamayı takip eden adet kanamasının ardından kürün kısaltılmış bir tarzda tekrarlanması tavsiye olunur. Bir kaç hafta süren daha uzun süreli uygulamalar özellikle bazı özel şartlardan dolayı (örneğin antibiyotik alınması, gebelik sırasında veya menopoz döneminde ortaya çıkan hormonel değişimler) normal vajen ortamının değişime uğramasının beklendiği durumlarda tavsiye edilmektedir. Eubiolac Verla® hiçbir sorun olmadan bir kaç ay süreyle de kullanılabilir.

Yan etkileri

Özellikle vajen mukozasının sürtünme veya kaşınma nedeniyle daha önce hasar görmüş olduğu durumlar başta olmak üzere arasıra vajende kaşıntı ve yanma oluşabilir. Bu yan etkileri önlemek için çoğu kez vajinal tabletin –dozaj talimatında açıklandığı gibi- vajene mümkün olduğu kadar derin bir şekilde sürülmesi yeterlidir.

Not: Kaşıntı çoğu kez vajen ortamında meydana gelen bozukluklar sonucunda ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarından da kaynaklanabilir. Bu durumda uygun bir mantar enfeksiyonu tedavisi uygulanmalıdır.

Raf ömrü

Bu tıbbi ürünün son kullanma tarihi katlanır kutunun ve blister ambalajın üzerine basılmıştır. Bu tıbbi ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.

Üretici firma

Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co.KG,
82324 Tutzing, www.verla.de

Bilgi güncelliği

Nisan 2015

CE 0197

7300506
0415