

Ranitidin-CT 150 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ranitidin



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Ranitidin-CT 150 mg und wofür wird es angewendet?

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg beachten?

3. Wie ist Ranitidin-CT 150 mg einzunehmen?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist Ranitidin-CT 150 mg aufzubewahren?

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Ranitidin-CT 150 mg und wofür wird es angewendet?



Ranitidin-CT 150 mg ist ein Magen-Darm-Mittel und gehört in die Gruppe der so genannten Histamin-H₂-Rezeptorblocker, die die Produktion von Magensäure verringern.

Bei Erwachsenen wird Ranitidin-CT 150 mg angewendet

- zur Behandlung von Zwölffingerdarmgeschwüren
- zur Behandlung von gutartigen Magengeschwüren
- zur Behandlung von Entzündungen der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft
- zur Behandlung des sog. Zollinger-Ellison-Syndroms (Geschwürbildung im Magen und Zwölffingerdarm aufgrund der erhöhten Produktion eines die Magensäureabsonderung stimulierenden Hormons durch einen bestimmten Tumor)
- zur Vorbeugung des Wiederauftretens von Zwölffingerdarmgeschwüren
- zur Fortsetzung der Behandlung zur Vorbeugung von Schleimhautblutungen im Magen- und Zwölffingerdarmbereich bei schwerkranken Patienten (Stressblutungsprophylaxe)
- zur einmaligen Gabe unter der Geburt zur Vorbeugung einer Einatmung von Magensäure

Bei Kindern (3 bis 18 Jahre) wird Ranitidin-CT 150 mg angewendet

- zur Kurzzeitbehandlung von peptischen Geschwüren (Zwölffingerdarm- und gutartigen Magengeschwüren)
- zur Behandlung von gastro-ösophagealen Refluxerkrankungen einschließlich Refluxkrankheiten der Speiseröhre (Refluxösophagitis) und Linderung der Symptome gastro-ösophagealer Refluxerkrankungen

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg beachten?



Ranitidin-CT 150 mg darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Ranitidin, andere so genannten H₂-Rezeptor-Antagonisten, oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ranitidin-CT 150 mg einnehmen,
- falls bei Ihnen ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür besteht. Dann sollte Ihr Arzt einen Test auf das Vorhandensein des Bakteriums *Helicobacter pylori* durchführen. Bei einem Befall des Magens mit diesem Keim sollte dann, wo immer möglich, eine Beseitigung dieses Bakteriums angestrebt werden.
 - falls bei Ihnen ein Magengeschwür besteht. Dann sollte Ihr Arzt durch geeignete Maßnahmen eine Bösartigkeit ausschließen, da die Einnahme von so genannten H₂-Antagonisten die Symptome des Magenkrebs verschleiern und damit dessen Diagnose verzögern kann.
 - wenn Sie unter der Stoffwechselkrankheit „akute Porphyrie“ leiden. Ranitidin kann akute Porphyrie-Anfälle auslösen.
 - falls bei Ihnen eine Nierenerkrankung besteht. Da Ranitidin über die Nieren ausgeschieden wird, kann es bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen

zu erhöhten Blutspiegeln kommen (beachten Sie hierzu bitte die Dosierungsanleitung).

- bei älteren Menschen, Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, Diabetes, Herzversagen oder mit geschwächtem Immunsystem. Das Risiko eine ambulant erworbene Lungenentzündung zu entwickeln kann erhöht sein.

Früh-, Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder

Kinder unter 3 Jahren und unter 30 kg Körpergewicht sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden, so lange keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen (siehe 3. „Wie ist Ranitidin-CT 150 mg einzunehmen?“).

Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Wirkung nachfolgend genannter Arzneistoffe bzw. Präparatgruppen kann bei gleichzeitiger Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg beeinflusst werden, bzw. sie können die Wirkung von Ranitidin-CT 150 mg beeinflussen:

- Antikoagulanzen vom Cumarintyp (z. B. Warfarin zur Blutverdünnung)
- Procainamid und N-Acetylprocainamid (zur Behandlung unregelmäßiger Herzschläge)
- Ketoconazol und andere Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen
- Atazanavir, Delavirdin (zur Behandlung von HIV-Infektionen)
- Gefitinib (zur Behandlung des Lungenkarzinoms)
- Antazida oder Sucralfat (zur Behandlung von Sodbrennen, säurebedingten Magenbeschwerden und Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren). Ranitidin sollte bei gleichzeitiger Einnahme dieser Arzneimittel immer 2 Stunden vor diesen Arzneimitteln eingenommen werden
- Glipizid (zur Behandlung der Zuckerkrankheit)
- Midazolam, Triazolam (Beruhigungs- und Schlafmittel)
- Theophyllin (zur Behandlung von Lungenerkrankungen; z. B. Asthma)

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg zusammen mit Alkohol

Unter der Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg kann die Alkoholwirkung erhöht sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung von Ranitidin bei Schwangeren haben keine Hinweise auf schädliche Wirkungen auf das ungeborene Kind oder die Schwangerschaft selbst ergeben. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie Ranitidin-CT 150 mg nur dann einnehmen, wenn Ihr behandelnder Arzt Ihnen dies ausdrücklich empfiehlt.

Stillzeit

Der Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Es gibt keine Untersuchungen darüber, ob die Aufnahme von Ranitidin über die Muttermilch für den Säugling schädliche Wirkungen hat. Sie sollten in der Stillzeit Ranitidin-CT 150 mg nicht einnehmen, es sei denn, Ihr behandelnder Arzt empfiehlt Ihnen dies ausdrücklich.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Aufgrund der Eigenschaften von Ranitidin ist ein Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Führen von Maschinen normalerweise nicht zu erwarten. Studien zu den Auswirkungen einer Einnahme von Ranitidin auf diese Fähigkeiten liegen jedoch nicht vor.

In seltenen Fällen können jedoch Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit, Verwirrtheits- und Unruhezustände sowie Halluzinationen auftreten, oder es kann durch die Wechselwirkung mit Alkohol (siehe „Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg zusammen mit Alkohol“) zu erhöhten Alkoholspiegeln bei gleichzeitigem Alkoholkonsum kommen, so dass Ihr Reaktionsvermögen und Ihre Urteilskraft vermindert werden, und die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit Maschinen zu bedienen, beeinträchtigt sein können.

3. Wie ist Ranitidin-CT 150 mg einzunehmen?



Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die empfohlene Dosis

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit normaler Nierenfunktion

Zwölffingerdarm- und gutartige Magengeschwüre
2 Filmtabletten Ranitidin-CT 150 mg (entsprechend 300 mg Ranitidin) nach dem Abendessen oder vor dem Schlafengehen oder jeweils 1 Filmtablette Ranitidin-CT 150 mg (entsprechend 150 mg Ranitidin) morgens und abends.
Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 4 – 8 Wochen.

Vorbeugung des Wiederauftretens von
Zwölffingerdarmgeschwüren

1 Filmtablette Ranitidin-CT 150 mg vor dem Schlafen-
gehen. Die Dauer der Behandlung beträgt bis zu
12 Monate.

Die Langzeittherapie ist bei Patienten angezeigt, aus
deren Vorgeschichte bekannt ist, dass sie zu Rück-
fällen neigen.

Entzündung der Speiseröhre durch Rückfluss von
Magensäure

2 Filmtabletten Ranitidin-CT 150 mg nach dem
Abendessen oder vor dem Schlafengehen oder
jeweils 1 Filmtablette Ranitidin-CT 150 mg morgens
und abends.

Die Behandlungsdauer beträgt 8 – 12 Wochen.

Zollinger-Ellison-Syndrom

Zu Beginn 3-mal täglich 1 Filmtablette Ranitidin-CT
150 mg (entsprechend 450 mg Ranitidin pro Tag).
Falls erforderlich, kann die Tagesdosis auf
4 – 6 Filmtabletten Ranitidin-CT 150 mg
(entsprechend 600 – 900 mg Ranitidin pro Tag)
gesteigert werden. Der Patient kann auf höhere Dosen
eingestellt werden, sollte dies nach Bestimmung der
Magensäuresekretion erforderlich sein (bis zu 6 g
Ranitidin pro Tag sind verabreicht worden).

Vorbeugung des Einatmens von Magensäure während
der Geburt

Einmalige Gabe von 1 Filmtablette Ranitidin-CT
150 mg.

Fortsetzung der Vorbeugung stressbedingter
Blutungen von Magen und Zwölffingerdarm

Sobald die Nahrungsaufnahme auf normalem Wege
wieder möglich ist, sind für die weitere Dauer der
Gefährdung 2-mal täglich 1 Filmtablette Ranitidin-CT
150 mg einzunehmen.

**Kinder von 3 bis 11 Jahren und über 30 kg
Körpergewicht**

Die Dosis wird auf Basis des Körpergewichts
bestimmt. Der behandelnde Arzt wird die dem Körper-
gewicht entsprechende Dosierung ermitteln.

Behandlung von akuten Zwölffingerdarm- oder
gutartigen Magengeschwüren

Die empfohlene Dosis beträgt zweimal täglich 2 mg
pro kg Körpergewicht für 4 Wochen. Diese Dosis kann
auf zweimal täglich 4 mg pro kg Körpergewicht erhöht
werden. Nehmen Sie jede Dosis mit einem Abstand
von 12 Stunden ein. Die maximale Tagesdosis beträgt
300 mg. Die Behandlungsdauer kann auf 8 Wochen
erhöht werden.

In der Regel beträgt die Dosis damit zweimal täglich
1 Filmtablette Ranitidin-CT 150 mg.

Behandlung von gastro-ösophagealen Reflux-
erkrankungen

Die empfohlene Dosis beträgt zweimal täglich 2,5 mg
pro kg Körpergewicht. Diese Dosis kann auf zweimal
täglich 5 mg pro kg Körpergewicht erhöht werden.
Nehmen Sie jede Dosis mit einem Abstand von
12 Stunden ein. Die maximale Tagesdosis beträgt
600 mg (die Maximaldosis trifft eher auf schwerere
Kinder oder Jugendliche mit schweren Symptomen zu).

In der Regel beträgt die Dosis damit zweimal täglich
eine Filmtablette Ranitidin-CT 150 mg. Bei schwereren
Kindern (Körpergewicht über 40 kg) mit schweren
Symptomen kann die Dosis auf zweimal täglich 2 Film-
tabletten Ranitidin-CT 150 mg erhöht werden.

**Dosierungsanleitung für Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion**

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
(Kreatinin-Clearance < 50 ml/min) sollten generell
eine Tagesdosis von 150 mg einnehmen.

Ranitidin ist dialysierbar. Durch Hämodialyse wird der
Ranitidinspiegel im Blut vermindert. Dialysepatienten
sollten deshalb die o. g. Ranitidindosis nach
Abschluss der Dialyse erhalten.

Art der Anwendung

Die Filmtablette wird unzerkaut mit ausreichend
Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) eingenommen.
Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten
erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,
wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von
Ranitidin-CT 150 mg zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von Ranitidin-CT
150 mg eingenommen haben, als Sie sollten**

Ranitidin-CT 150 mg wirkt sehr gezielt, und es sind
nach einer Überdosierung mit dem Präparat in der
Regel keine besonderen Probleme zu erwarten.

Verständigen Sie trotzdem bitte bei Überdosierung
unverzüglich einen Arzt, damit er über das weitere
Vorgehen entscheiden kann.

**Wenn Sie die Einnahme von Ranitidin-CT 150 mg
vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie
die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses
Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt
oder Apotheker.

**Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 Behandelte von
1.000)**

- Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel
- Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit
(diese Symptome besserten sich meist im Verlauf
der Behandlung)
- vorübergehende Veränderungen der Leberfunk-
tionswerte
- Hautausschlag

Selten (betrifft 1 bis 10 Behandelte von 10.000)

- Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Haut-
ausschlag, Fieber, Blutdruckabfall, Schwellungen
im Gesicht, Schluckbeschwerden, Atem-
beklemmungen, Brustschmerzen)
- vorübergehendes verschwommenes Sehen
- akute Bauchspeicheldrüsenentzündung
- Leberentzündung mit oder ohne Gelbsucht
- Erythema multiforme (eine spezielle Form des
Hautausschlages), Juckreiz
- Gelenksbeschwerden, Muskelschmerzen
- Erhöhung der Plasmakreatininwerte (Wert für die
Nierenfunktion)

**Sehr selten (betrifft weniger als 1 Behandelten
von 10.000)**

- Veränderungen des Blutbildes mit Verringerung
einer, mehrerer oder aller Blutzellen
- allergischer Kreislaufschock
- Unruhezustände, vorübergehende Verwirrtheits-
zustände, Halluzinationen, Depressionen (diese
Nebenwirkungen wurden überwiegend bei
schwerkranken Patienten, älteren Patienten und
Patienten mit Nierenerkrankungen beobachtet)
- schwere Kopfschmerzen, vorübergehende unwill-
kürliche Bewegungsstörungen
- Herzrhythmusstörungen
- Gefäßentzündungen
- vermehrter Haarausfall
- akute Nierenentzündung
- Brustschmerzen und Schwellung der Brust bei
Männern, Milchfluss, Libidoverlust, vorübergehende
Impotenz

**Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der
verfügbaren Daten nicht abschätzbar)**

- Lungenentzündung (siehe 2. unter „Warnhinweise
und Vorsichtsmaßnahmen“)
- Atemnot (Dyspnoe)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie
sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für
Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage
angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch
direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie
Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen,
dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. Wie ist Ranitidin-CT 150 mg
aufzubewahren?**



Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder
unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem
Blister und der Faltschachtel angegebenen Verfall-
datum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum
bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen
Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

**6. Inhalt der Packung und weitere
Informationen**



Was Ranitidin-CT 150 mg enthält

Der Wirkstoff ist Ranitidin.

Jede Filmtablette enthält 150 mg Ranitidin
(als Hydrochlorid).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Siliciumdioxid, Mikrokristalline Cellulose,
Croscarmellose Natrium, Magnesiumstearat (Ph.Eur.),
Titandioxid (E 171), Polydextrose, Hypromellose,
Triethylcitrat, Macrogol.

**Wie Ranitidin-CT 150 mg aussieht und Inhalt der
Packung**

Weiße, runde Filmtabletten mit Bruchkerbe auf einer
Seite.

Ranitidin-CT 150 mg ist in Packungen mit 10, 20,
50 und 100 Filmtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Hersteller

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt
überarbeitet im**

Juli 2014

Versionscode: Z09

**4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?**



Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel
Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem
auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden in klinischen
Studien mit Ranitidin oder in der Alltagsanwendung
beobachtet.