Gebrauchsanweisung

Utipro® plus

Verwendungszweck
Das Medizinprodukt Utipro® plus ist zur Kontrolle und Prävention von Harnwegsinfekten vorgesehen, die durch Pathogene wie E.coli und andere, für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligte, gramnegative Bakterien verursacht werden.

Das Präparat auf Xyloglucan- (Hemicellulose) und Gelatinebasis wirkt mechanisch im Inneren des Darmes, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbunden wird – der erste Schritt um die Proliferation und die darauffolgende Übertragung auf die Harnwege zu hemmen.

Utipro® plus wird bei Auftreten der ersten Symptome von Harnwegsbeschwerden oral eingenommen, um die Proliferation der Pathogene zu hemmen, die zu Infektionen führen könnten. Bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten durch Proliferation des Pathogens ist das Produkt auch zur Vorbeugung solcher Episoden vorgesehen.

Verpackung
Blisterpackung mit 15 oder 30 Kapseln.

Zusammensetzung
Xyloglucan, Schweinegelatine, Propolis, Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (pflanzlich), Maisstärke.

Anwendungshinweis
Die Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit schlucken.

Dosierung
Patienten, bei denen erste Symptome eines Harnweginfekts auftreten, nehmen 2 Kapseln Utipro® plus am Tag über fünf Tage oral ein (1 Kapsel alle 12 Stunden).
Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich eine Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen. Gegebenenfalls kann die Behandlung wiederholt werden.

Warnhinweise
- Die Diagnose einer Harnwegserkrankung muss von einem Arzt gestellt werden.
- Eine akute Harnwegserkrankung kann die Behandlung mit einem Antibiotikum erfordern. Dieses Produkt hat weder bakteriozide noch bakteriostatische Eigenschaften und kann daher eine Behandlung mit Antibiotikum nicht ersetzen. Jedoch kann Utipro® plus als Begleittherapie verabreicht werden.
- Auch wenn keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollten Sie das Produkt während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht anwenden, sofern Ihr Arzt Ihnen nichts Gegenteiliges empfohlen hat.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie das Produkt nicht ein, wenn die Blister geöffnet oder beschädigt sind.
- Bei Zimmertemperatur trocken und von Wärmequellen entfernt lagern. Nicht einfrieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gegenanzeigen
Utipro® plus darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan, Gelatine oder einen der Bestandteile des Produkts bekannt ist.

Stand der Information
Mai 2017

Hersteller:
NOVENTURE, S.L
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona - Spain

Vertrieb in Deutschland durch:

Trommsdorff
GmbH & Co. KG
52475 Alsdorf

www.utipro.de

CE 0373

13079922/04-1705
Rev. 02: 21.11.2016