Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Antiadipositum RIEMSER,
Phenylpropanolaminhydrochlorid 49,6 mg, Thiaminchloridhydrochlorid 2 mg, Pyridoxinhydrochlorid 2 mg, Ascorbinsäure 75 mg; Retardkapseln

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist Antiadipositum RIEMSER und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Antiadipositum RIEMSER beachten?
3. Wie ist Antiadipositum RIEMSER einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antiadipositum RIEMSER aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ANTIADIPOSITUM RIEMSER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?
Antiadipositum RIEMSER ist ein Abmagerungsmittel, Appetithemmer.

Antiadipositum RIEMSER wird angewendet:
- zur kurzfristigen, bis zu vier Wochen dauernden unterstützenden Behandlung ernährungsbedingten Übergewichts.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANTIADIPOSITUM RIEMSER BEACHTEN?
Antiadipositum RIEMSER darf nicht eingenommen werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Phenylpropanolaminhydrochlorid, Amaranth oder einen der sonstigen Bestandteile von Antiadipositum RIEMSER sind,
- bei erhöhtem Blutdruck, Herzjagen, Herzklopfen, Herz- und Gefäßerkrankungen,
- bei Zuckerkrankheit,
- bei Nierenerkrankungen,
- bei Schilddrüsenerkrankungen,
- bei psychiatrischen Erkrankungen,
- bei Prostatavergrößerung mit Restharnbildung,
- bei Grünem Star (Engwinkelglaukom),
- bei Phäochromozytom (einer Nebennierenmarkserkrankung mit erhöhtem Blutdruck),
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Antiadipositum RIEMSER ist erforderlich,
- bei Personen unter 18 und über 60 Jahren sowie bei krankhaften Essstörungen: Die Einnahme darf nur auf ärztliche Empfehlung erfolgen.
- Antiadipositum RIEMSER enthält eine zentral erregende Substanz, die nur eine begrenzte Zeit eine appetithemmende Wirkung entfaltet. Bei länger als vier Wochen dauerndem Gebrauch können schwere Gesundheitsstörungen (Konzentrationsstörungen, Leistungsschwäche, Erregungszustände, Reizbarkeit, Persönlichkeitsveränderungen, Schlafstörungen und Erschöpfungszustände) auftreten. Deshalb muss nach einer vierwöchigen Einnahme eine Behandlungspause von mindestens zwei (besser drei) Monaten eingelegt werden. Bei Dauergebrauch besteht die Gefahr der Abhängigkeit und schwerer geistiger Veränderungen (Verkennungen, Psychosen) sowie depressiver Verstimmungen beim Absetzen.

Bei Einnahme von Antiadipositum RIEMSER mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
Antiadipositum RIEMSER soll nicht gleichzeitig mit Präparaten eingenommen werden, die den Arzneistoff Guanethidin enthalten (Verstärkung der sympathomimetischen Wirkung). Das gleiche gilt für Schnupfen- und Erkältungspräparate sowie Asthmamittel, die DL-Norephedrin (Phenylpropanolamin) oder andere ephedrinartige Wirkstoffe und blutdrucksteigernde Mittel enthalten. Ebenfalls ist eine Wechselwirkung mit dem Narkosemittel Halothan (Herzrhythmusstörungen) zu beachten.
Die Anwendung von Antiadipositum RIEMSER während und bis zu 2 Wochen nach einer Therapie mit Monoaminoxidase (MAO)- Hemmern (Arzneimittel, die bei depressiven Zuständen angewandt werden) muss unterbleiben, weil es sonst zu krisenhaftem Blutdruckanstieg kommen kann. Sollten Sie unter einer Therapie mit Antidepressiva stehen, fragen Sie vor der ersten Einnahme von Antiadipositum RIEMSER Ihren Arzt oder Apotheker.

Schwangerschaft und Stillzeit
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie dürfen Antiadipositum RIEMSER nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Appetithemmer sollen grundsätzlich nicht in diesen Lebensabschnitten angewandt werden und es liegen keine ausreichenden Erfahrungen beim Menschen vor. Tierversuche ergaben keine Hinweise auf schädliche Wirkungen einer therapeutischen Dosis.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen soweit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antiadipositum RIEMSER
Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Antiadipositum RIEMSER erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST ANTIADIPOSITUM RIEMSER EINZUNEHMEN?
Nehmen Sie Antiadipositum RIEMSER immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene nehmen 1 x täglich 1 Retardkapsel Antiadipositum RIEMSER nach dem Frühstück unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein.
Hinweis: Eine Überschreitung der empfohlenen Dosis führt nicht zu einer stärkeren Wirkung.

Dauer der Anwendung
Nicht länger als vier Wochen einnehmen (siehe Abschnitt 2 "Besondere Vorsicht …" und Abschnitt 4 "Nebenwirkungen“).
Sollte eine weitergehende Gewichtsreduktion angezeigt sein, kann Antiadipositum RIEMSER nach der Behandlungspause wieder angewendet werden. Auch zwischenzeitlich ist auf eine Beschränkung der Kalorienzufuhr zu achten, um den bereits erzielten Erfolg nicht zu gefährden.

Wenn Sie eine größere Menge Antiadipositum RIEMSER eingenommen haben als Sie sollten
Bei versehentlicher oder beabsichtigter Überdosierung von Antiadipositum RIEMSER kann es zu Übelkeit oder Erbrechen, Unruhe, Kopfschmerzen, Benommenheit mit erheblichem Blutdruckanstieg kommen. Es können Herzrhythmusstörungen, Ängstlichkeit oder Erregungszustände auftreten. Bei einer Überdosierung sollte immer ärztlicher Hilfe in Anspruch genommen werden, insbesondere wenn eines der oben genannten Symptome auftritt.

Wenn Sie die Einnahme von Antiadipositum RIEMSER vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Antiadipositum RIEMSER abbrechen
Nach nicht empfohlenem Dauergebrauch besteht die Gefahr depressiver Verstimmungen beim Absetzen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
Wie alle Arzneimittel kann Antiadipositum RIEMSER Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen
Nebenwirkungen verschwinden im Allgemeinen sofort nach Absetzen des Präparates.

Herz- und Gefäßsystem
In einigen Fällen kommt es zur Steigerung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz, zu Störungen des Herzrhythmus und evtl. zu Herzschmerzen.

Nervensystem
Bei besonders disponierten Patienten können Nervosität, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder eine Erschwerung des Wasserlassens auftreten.
Bei nicht bestimmungsgemäßem Dauergebrauch besteht die Gefahr der Abhängigkeit und schwerer geistiger Veränderungen (Verkennungen, Psychosen) sowie depressiver Verstimmungen beim Absetzen (siehe Punkt 2).

Immunsystem
Amaranth kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, ist die Einnahme von Antiadipositum RIEMSER zu beenden. Im Falle stärkerer Beschwerden oder wenn die Beschwerden trotz Beendigung der Einnahme länger andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn einer der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ANTIADIPOSITUM RIEMSER AUFZUBEWAHREN?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und der Faltschachtel nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen
Vor Feuchtigkeit schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN
Was Antiadipositum RIEMSER enthält
Die Wirkstoffe sind:
1 Retardkapsel enthält Phenylpropanolaminhydrochlorid (DL-Norephedrinhydrochlorid) 49,6 mg, Thiaminchloridhydrochlorid (Ph. Eur.) 2,0 mg, Pyridoxinhydrochlorid 2,0 mg, Ascorbinsäure 75,0 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Sucrose (Saccharose), Gelatine, Maisstärke, Schellack, Talkum, Carnaubawachs, Stearinsäure, Macrogol 6000, Povidon 25, Natriumdodecylsulfat, Titandioxid (E 171), Chinolingelb (E 104), Amaranth 85 (E 123), Erythrosin (E 127).

Wie Antiadipositum RIEMSER aussieht und Inhalt der Packung
Retardkapseln: gelbes Ober- und transparentes Unterteil, Inhalt: fast weiße und rote Pellets.

OP mit 30 bzw. 20 Retardkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer

RIEMSER Pharma GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald - Insel Riems
phone +49 38351 76-0
fax +49 38351 308
e-mail info@RIEMSER.com

Hersteller

RIEMSER Specialty Production GmbH
Mittelstrasse 18
88471 Laupheim

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2012.