zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

PHARMAZEUTISCHE FABRIK
DR. RECKEWEG & CO GMBH
BENSHEIM

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 6251) 10 97-0 · Fax (06251) 3342
http://www.reckeweg.de

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss „Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12" jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler ***Nr. 3***

Ferrum phosphoricum D12

Tabletten

1. WAS IST *„BIOCHEMISCHES FUNKTIONSMITTEL NACH DR. SCHÜßLER NR. 3, FERRUM PHOSPHORICUM D12"* UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12" ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON *„BIOCHEMISCHES FUNKTIONSMITTEL NACH DR. SCHÜßLER NR. 3, FERRUM PHOSPHORICUM D12"* BEACHTEN?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12"* ist erforderlich:

- bei Kindern und Jugendlichen:

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren erfolgt nur nach Rücksprache mit dem homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

- in Schwangerschaft und Stillzeit:

Wie alle Arzneimittel sollte auch dieses in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von *„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12"* mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von *„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12"* zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von *„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12"*

Das Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie ***„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12"*** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2014

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

3. WIE IST *„BIOCHEMISCHES FUNKTIONSMITTEL NACH DR. SCHÜßLER NR. 3, FERRUM PHOSPHORICUM D12“* ANZUWENDEN?

Bitte nehmen Sie ***„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12“*** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage bzw. nach Verordnung oder nach der mit Ihrem Apotheker getroffenen Absprache ein. Bitte fragen Sie auch bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
Soweit nicht anders verordnet:
Erwachsene nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1 Tablette ein.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für ***„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr. 3, Ferrum phosphoricum D12“*** keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST *„BIOCHEMISCHES FUNKTIONSMITTEL NACH DR. SCHÜßLER NR.3, FERRUM PHOSPHORICUM D12“* AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:
Nach Anbruch 9 Monate haltbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Das Arzneimittel ***„Biochemisches Funktionsmittel nach Dr. Schüßler Nr.3, Ferrum phosphoricum D12“*** enthält:
1 Tablette enthält: Wirkstoff: Ferrum phosphoricum Trit. D12 100 mg. Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Croscarmellose-Natrium.

Darreichungsform und Packungsgrößen:
Glas mit 200 Tabletten zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim
Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342
E-Mail: info@reckeweg.de · www.reckeweg.de

Reg.-Nr.: 86969.00.00

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2014.

Wichtiger Hinweis für Patienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten:

Dieses Arzneimittel ist weizenstärke- und glutenfrei.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2014